

Cacicol

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Ricostituente della matrice extracellulare per la rigenerazione tissutale. Guarigione delle lesioni corneali. Collirio soluzione.

COMPOSIZIONE:

Poli (carbossimetilglucosio solfato), destrano T40, cloruro di sodio, acqua depurata. La confezione contiene 5 contenitori monodose da 0,33 ml di collirio soluzione, confezionati in busta di alluminio. Soluzione senza conservanti.

QUANDO USARE CACICOL:

CACICOL® viene utilizzato per favorire la guarigione di lesioni corneali croniche, quali i difetti epiteliali **persistenti**, e le **distrofie corneali persistenti anteriori associate a dolore**. Si consiglia di utilizzare CACICOL® secondo la prescrizione medica.

PROPRIETÀ:

CACICOL® appartiene alla famiglia delle RGTA® (Agenti RiGeneraTivi) che favoriscono sia la velocità che la qualità dei fenomeni di riparazione tissutale. Favorisce il processo di rigenerazione tissutale, la ristrutturazione dell'architettura della matrice extracellulare, e riduce il dolore associato.

COME UTILIZZARE CACICOL®:

MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE: INSTILLAZIONE OCULARE.

- Lavare accuratamente le mani prima di applicare il prodotto.
- Aprire la busta in alluminio.
- Prendere un contenitore monodose dalla confezione e chiudere accuratamente la busta in alluminio.
- Aprire il contenitore monodose.
- Introdurre da una a due gocce nell'occhio che deve essere trattato, guardando verso l'alto e distendendo verso il basso la palpebra inferiore.
- Evitare il contatto dell'occhio e delle palpebre con il beccuccio del contagocce del contenitore monodose.
- Eliminare il contenitore monodose dopo l'uso. Non tenere il contenitore per un successivo utilizzo.

POSOLOGIA:

Utilizzare CACICOL® esattamente come prescritto dal medico. Introdurre da una a due gocce di CACICOL® una volta a settimana.

Questo dosaggio può essere **modificato dal proprio oftalmologo**. L'uso più frequente di quanto prescritto può compromettere l'effetto di CACICOL®. Se ha necessità di instillare un altro trattamento nei suoi occhi oltre a CACICOL®, applichi per primo CACICOL® e attenda almeno 15 minuti prima di applicare un altro prodotto. Informi il suo oculista se sta prendendo o ha recentemente preso un altro prodotto oftalmico per uso topico, inclusi i prodotti senza prescrizione medica.

SPECIALI AVVERTENZE E PRECAUZIONI:

- Non utilizzare in pazienti al di sotto dei 18 anni.
 - Non utilizzare durante la gravidanza e l'allattamento.
 - Utilizzare il prodotto esattamente come prescritto dall'oculista.
 - Non utilizzare in caso di infezioni oculari in corso.
 - Non utilizzare con antibiotici locali contenenti aminoglicosidi come la neomicina o la gentamicina.
 - Non utilizzare con soluzioni contenenti sali di argento, iodio e rame (gli ioni possono complessare la molecola).
 - Non utilizzare in caso di allergia a uno qualsiasi degli ingredienti.
 - Non utilizzare i contenitori danneggiati.
 - Non aprire il contenitore con l'ausilio di strumenti.
 - Non toccare la superficie dell'occhio con il beccuccio del contenitore.
 - Non iniettare, non ingerire.
- Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

COME CONSERVARE CACICOL®:

Conservare a temperature tra 4 e 25°C. Mantenere i contenitori monodose non utilizzati nella busta di alluminio per proteggerli dalla luce diretta. **NON UTILIZZARE DOPO LA DATA DI SCADENZA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE**. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato nella confezione originale. Non utilizzare i contenitori monodose danneggiati. Eliminare il contenitore monodose aperto con la soluzione residua immediatamente dopo il primo utilizzo.

FABBRICANTE:

OTR3 - 4 rue Française - 75001 Paris - Francia.

CLASSE	PREZZO AL PUBBLICO
CE 0499	€ 60,00

Collirio soluzione (5 monodose)